


## CONTEXTE ET OBJECTIF

Dans un contexte où la 5<sup>e</sup> vague au Québec a été caractérisée par une augmentation des cas de COVID-19 et où l'accès au dépistage par tests PCR est limité aux clientèles prioritaires et travailleurs essentiels depuis le 4 janvier 2022, nous avons mis en place une étude exploratoire visant à estimer l'incidence des cas de COVID-19. Les premières semaines de l'étude exploratoire nous ont permis de constater la fiabilité des méthodes et de valider la qualité des estimations obtenues par échantillonnage indirect avec la méthode de l'amplificateur par réseau.

Ce supplément présente les résultats des estimations de l'incidence de cas de COVID-19 au Québec pour la quatrième semaine de collecte de données, du 3 au 8 février 2022, et les compare aux trois premières collectes.



Dans un contexte de crise sanitaire, il est important d'avoir accès à toutes les données possibles afin de soutenir et d'éclairer la prise de décision publique. Ne pas connaître l'incidence des cas de COVID-19 est un enjeu important puisque (1) le nombre de nouveaux cas est un indicateur avancé des hospitalisations à venir et (2) la mesure du taux d'hospitalisation parmi ceux ayant la COVID-19 permet de juger de la sévérité des variants et donc des mesures qui doivent être mises en place pour réduire leur propagation.

Cette étude s'appuie à la fois sur une stratégie d'échantillonnage direct et sur une estimation par échantillonnage indirect basée sur la méthode de l'amplificateur par réseau (APR ou *network scale-up*). Le détail des méthodes, le questionnaire d'enquête, la description de la première collecte de données et les résultats des estimations pour la semaine finissant entre le 13 et 18 janvier 2022 sont disponibles dans le cahier scientifique CIRANO [2022s-03](#) (des suppléments présentant les résultats de la deuxième et de la troisième semaine de collecte sont aussi disponibles dans cette même page).

## MÉTHODOLOGIE

Un nouvel échantillon représentatif de la population a été interrogé par Internet entre le 3 et le 8 février 2022 inclusivement. Les répondants, tous âgés de plus de 18 ans, pouvaient s'exprimer en français ou en anglais. Au total, 3003 personnes sélectionnées selon la méthode des quotas et des strates ont répondu au questionnaire. La durée moyenne pour répondre au questionnaire de l'enquête a été de 6 minutes 49 secondes avec une médiane de 5 minutes et 02 secondes. L'enquête a été réalisée avec le panel en ligne Léger Opinion (LEO). Les répondants ont été sélectionnés de façon aléatoire dans le panel. À l'aide des statistiques du Recensement de 2016 de Statistique Canada, les résultats ont été pondérés par la firme de sondage selon l'âge, le sexe, la langue maternelle, le niveau de scolarité, la présence d'enfants et la région afin de rendre l'échantillon représentatif de l'ensemble de la population adulte du Québec.

La question permettant d'estimer l'incidence de la COVID-19 au sein de la population adulte au cours des sept derniers jours à partir de la méthode d'échantillonnage direct est la suivante et est identique pour chaque période de collecte :

*« Dans les sept derniers jours incluant aujourd'hui, avez-vous eu un résultat de test positif à la COVID-19 ? » (Trois choix de réponse possibles : Oui, Non et Pas de résultat de test, mais je crois que je l'ai contractée [autodiagnostic en fonction de mes symptômes des sept derniers jours])*

La question cible permettant de calculer le nombre de personnes ayant nouvellement eu la COVID-19 au sein de la population générale sur les sept derniers jours en utilisant l'échantillonnage indirect et la méthode APR est la suivante, et est également identique pour chaque période de collecte :

*« Combien connaissez-vous de personnes ayant eu un résultat de test positif pour la COVID-19 au cours des sept derniers jours (incluant aujourd'hui) ? »*

## RÉSULTATS

### Estimation de l'incidence de la COVID-19 pour la quatrième semaine de collecte

Le tableau 1 présente l'incidence hebdomadaire et journalière des cas pour les quatre semaines de collecte selon les différentes méthodes d'estimation : par échantillonnage direct et à l'aide des deux estimateurs issus de la méthode par amplificateur par réseau (APR). La figure 1 présente les résultats hebdomadaires officiels d'incidence des cas basés sur les tests PCR (réservés exclusivement aux clientèles prioritaires et travailleurs essentiels), ainsi que les résultats selon nos différents estimateurs pour les quatre semaines de collecte en incluant les intervalles de confiance.

Le nombre d'adultes ayant nouvellement eu la COVID-19 sur la base de tests PCR, de tests rapides ou par autodiagnostic sur les sept derniers jours est de 216 815 (30 974 cas par jour) selon notre estimation par échantillonnage direct. En excluant les autodiagnosics, nous obtenons plutôt 132 304 cas sur les sept derniers jours, soit 18 901 cas en moyenne par jour.

Par la méthode de l'amplificateur par réseau, nous obtenons des estimations de 171 975 cas (soit 24 568 cas par jour) avec l'estimateur de Killworth et al. (1998) et de 162 586 nouveaux cas pour la semaine considérée (soit 23 227 cas par jour), en utilisant l'estimateur de Habecker et al. (2015). Comme le montre la figure 1, ces chiffres sont beaucoup plus élevés que le chiffre officiel basé sur les tests PCR (réservés exclusivement aux clientèles prioritaires et travailleurs essentiels) publié par l'INSPQ sur la même période, soit 21 032 cas (3005 cas/jour).

		<b>Adultes avec test positif (PCR ou rapide)</b>	<b>Adultes avec test positif (PCR ou rapide) et autodiagnostic basé sur les symptômes</b>	<b>Population totale - Estimateur #1 (Killworth et al.)</b>	<b>Population totale - Estimateur #2 (Habecker et al.)</b>
<b>Nombre de cas sur 7 jours (écart-type)</b>	<b>SEMAINE 1</b>	261 863 (24 431)	407 430 (30 925)	251 706 (10 758)	231 960 (11 072)
	<b>SEMAINE 2</b>	211 591 (23 566)	305 571 (27 883)	215 247 (10 979)	200 565 (11 195)
	<b>SEMAINE 3</b>	183 530 (23 503)	298 311 (30 176)	181 396 (9123)	161 308 (9304)
	<b>SEMAINE 4</b>	132 304 (19 081)	216 815 (24 729)	171 975 (9329)	162 586 (9432)
<b>Nombre de cas par jour (écart-type)</b>	<b>SEMAINE 1</b>	37 409 (3490)	58 204 (4418)	35 958 (1537)	33 138 (1582)
	<b>SEMAINE 2</b>	30 227 (3367)	43 653 (3983)	30 749 (1568)	28 652 (1599)
	<b>SEMAINE 3</b>	26 219 (3358)	42 616 (4311)	25 914 (1303)	23 044 (1329)
	<b>SEMAINE 4</b>	18 901 (2726)	30 974 (3533)	24 568 (1333)	23 227 (1347)

Tableau 1 - Estimations du nombre de nouveaux cas de COVID-19 selon plusieurs méthodes sur une base de sept jours (7 j) et moyenne par jour (j). Les deux premières colonnes présentent l'incidence estimée chez les adultes : la première colonne présente l'incidence estimée sur la question individuelle basée sur un test positif (PCR ou rapide), tandis que la deuxième présente l'incidence estimée sur la question individuelle, mais en ajoutant l'autodiagnostic en fonction des symptômes. Les deux colonnes suivantes présentent l'incidence estimée dans la population totale : la troisième colonne présente l'incidence sur la base de la méthode de l'amplificateur par réseau en utilisant l'estimateur par maximum de vraisemblance de Killworth et al. (1998), alors que la dernière colonne utilise plutôt l'estimateur de Habecker et al. (2015).




Figure 1 : Estimations de l'incidence de la COVID-19, avec intervalles de confiance à 95 %. Nous présentons le nombre de nouveaux cas dans la population totale tel que rapporté par l'INSPQ pour les quatre semaines de collecte (tests PCR positifs - voir note 10 pour plus de précisions) ; nos estimations selon la méthode de l'amplificateur par réseau, selon les estimateurs de Killworth et al. (1998) et de Habecker et al. (2015) ; et l'incidence chez les adultes estimée à l'aide de la méthode directe (question individuelle pour les 18 ans et plus). Nous présentons aussi l'incidence chez les adultes en incluant les autodiagnostic.

#### Comparaison de l'incidence entre la Semaine 3 et la Semaine 4

Le nombre de nouveaux cas pour cette semaine de collecte est environ 28 % plus faible que celui estimé la semaine précédente pour les estimations avec la méthode directe. Par contre, avec les estimations sur la population totale par la méthode de l'amplificateur par réseau, on note une baisse beaucoup moins prononcée, voire même une très légère hausse avec l'estimateur de Habecker et al. (0,8 %). À titre informatif, la décroissance des cas observée dans les données basées sur les tests PCR colligées par l'INSPQ est d'environ 10 % entre la semaine 3 et la semaine 4 de collecte.

Différence : sem. 4 - sem. 3	Nb cas (7 j)	Écart- type	Statistique t	p- value
<b>Direct positifs</b>	-51 226	30 273	-1,69	0,091
<b>Avec autodiagnosics</b>	-81 496	39 014	-2,09	0,037
<b>APR, Killworth et al. (1998)</b>	-9 421	13 048	-0,72	0,470
<b>APR, Habecker et al. (2015)</b>	1 278	13 249	0,10	1,077
<b>Données colligées par l'INSPQ avec les tests PCR uniquement</b>	-2 238	s.o.	s.o.	s.o.

Tableau 2 - Estimation de la tendance du nombre de nouveaux cas de COVID-19 de la semaine 3 à la semaine 4 selon plusieurs méthodes sur une base de sept jours (7 j). L'écart-type de la différence est aussi rapporté, ainsi que la statistique *t*, dont le seuil critique pour un niveau de confiance de 5 % est de 1,96. À ce seuil, une p-value inférieure à 0,05 indique une différence significative. La première ligne montre l'incidence chez les adultes, basée sur un test positif (PCR ou rapide), à partir de la question individuelle. La deuxième ligne inclut également ceux rapportant qu'ils ont eu la COVID-19 sur la base d'un autodiagnostic en fonction des symptômes. La troisième ligne montre la variation de l'incidence dans la population totale sur la base de la méthode de l'amplificateur par réseau en utilisant l'estimateur par maximum de vraisemblance de Killworth et al. (1998), alors que la quatrième ligne utilise plutôt l'estimateur de Habecker et al. (2015). Finalement, la dernière ligne indique, à titre de référence, la tendance observée dans les données officielles colligées par l'INSPQ.

### Données sur l'autodéclaration

Le gouvernement a annoncé le 25 janvier 2022 la mise en place d'une nouvelle plateforme d'autodéclaration des tests rapides de COVID-19. Celle-ci pourrait constituer une source de données supplémentaires pour estimer le nombre de nouveaux cas au Québec. Comme il s'agit d'une plateforme à déclaration volontaire, une question supplémentaire sur l'inscription des résultats de test des Québécois sur la plateforme a été ajoutée à notre questionnaire. Voici la question ajoutée, posée uniquement aux répondants indiquant avoir reçu un résultat positif à la COVID-19 avec un test rapide :

*« Avez-vous déclaré votre résultat de test rapide sur la plateforme gouvernementale d'autodéclaration ? »*

Cette semaine, 41 % des répondants ayant reçu un résultat de test positif ont affirmé l'avoir déclaré sur la plateforme d'autodéclaration du gouvernement, alors que cette proportion était de 29 % la semaine précédente (la différence entre les semaines de collecte 3 et 4 est significative ;  $p < 0,001$ ).

## CONCLUSION

Les données collectées au temps 4 indiquent toujours une baisse avec la méthode directe, mais celle-ci est marginalement statistiquement significative. Les estimations utilisant la méthode de l'amplificateur par réseau ne donnent pas de baisse significative. Les deux estimateurs basés sur l'APR indiquent plutôt un plateau d'un point de vue statistique. Il faudra attendre la semaine 5 pour voir s'il y a un renversement de tendance.

## Ressources complémentaires

- Cahier scientifique de référence : Boisclair, D., Borgès Da Silva, R., Boucher, V., De Marcellis-Warin, N., Michaud, P-C et Peignier, I. (2022). Combien de personnes ont développé des symptômes ou contracté la Covid-19 au Québec ? Une étude exploratoire (2022s-03). <https://doi.org/10.54932/KWYT2364>
- Les données ainsi que les scripts ayant produit les résultats de cette note sont disponibles sur le site <https://www.github.com/pcmichaud/EnqueteCovid.git>